

ницата, въ сравнение съ другитѣ хлѣбни растения, има най-голѣмо значение за нашето земледѣлие, при нейното обработване не се обръща заслужаващото внимание. Отъ една страна земята, засѣта съ пшеница, доста отслабва, понеже не се тори, а отъ друга — сѣмето се изражда и примѣсва съ разни бурени. Ако нашиятъ земледѣлецъ продължава да бжде небрѣженъ при избора и прѣчистванто на пшеничното сѣме, то не слѣдъ много години пшеницата у насъ може да се изроди и въ такъвъ случай нѣма да дава очакванитѣ приходи.

Още отъ незапомнени врѣмена и до днесъ у насъ се отгледватъ разни видове пшенични растения; но повечето земледѣлци не познаватъ тия видове, при все че това има голѣмо значение за тѣхъ, тъй като не всичкитѣ видове пшенични растения успѣшно могатъ да вирѣятъ на всѣко мѣсто; едни вирѣятъ при по-студенъ климатъ, а други при много топълъ; едни изискватъ много влага, а други по-малко такава; едни вирѣятъ добрѣ на глинеата черноземна почва; едни полягатъ лесно, други страдатъ отъ болести и т. н. Разумниятъ земледѣлецъ трѣбва да знае, кои отъ разпространнитѣ у насъ пшеници сж най-сгодни за условията, при които той стопанствува, и кои могатъ да му дадатъ най-голѣма печалба. Има пшеници, които, засѣти на извѣстна почва, даватъ най-много 300 кгр. зърно на декаръ, а има и такива, които на сжщата почва биха дали до 500 кгр.

Споредъ врѣмето, прѣзъ което се сѣе, различаватъ **зимна** и **пролѣтна пшеница** или **лѣтница**. Послѣдната се сѣе у насъ много по-малко отъ първата.

А споредъ това, дали зърната на пшеничния класъ слѣдъ вършидбата сж голи или пѣкъ сж покрити съ плѣва (подобно на ечемика), различаватъ **голи** или **сжщи пшеници** и **плѣвести** или **несжщи**. Послѣдната се сѣе у насъ много по-малко отъ първитѣ.

Отъ сжщитѣ пшеници у насъ се сѣятъ най-много **обикновената** или **меката** и **твърдата** пше-