

Характеристики на слуха и зрението

Изследването на проблемите със слуха и зрението обхваща само възрастните роми (над 16-годишна възраст). Оказа се, че всяко трето изследвано лице има някакъв зрителен или слухов проблем или и двата. Сравнителните данни по страни са представени в таблица 40.

По-голям е делът на ромите, които имат слухови оплаквания. По-често страдат от смущения в слуха, отколкото със зрението ромите в Румъния, Гърция, Чехия и Словакия. Всеки втори ром в Румъния е декларирал някакви проблеми със слуха. Българските и испанските роми най-често споделят, че страдат от различни зрителни проблеми.

В България почти една пета от ромите имат проблеми със зрението (18,6%), а една девета (12,0%) – със слуха. Най-често те се проявяват при най-възрастните роми. Няма статистически данни за влияние на пола върху тези здравни проблеми. Разпределението им по възрастови групи е представено в таблица 41.

Преждевременните раждания и дългият престой на недоносени бебета в кувьоз са причина за част от зрителните проблеми на малките, които обикновено водят до пълно ослепяване. Съвременна апаратура, предпазваща бебетата от увреждане на зрението в този критичен период, има само в най-големите болници в България. В отделни случаи продължително лечение с антибиотици в първата година от живота става причина за загуба на слуха на децата. Много такива случаи констатирахме в Северозападна България, Сливен и на други места при предишни изследвания.

През последните години д-р Търнев изучава наследствената обремененост при някои от влашките групи и при субгрупи на хорахана рома за специфична форма на глаукома. Той започна програма за превенция на предаването на болестта при следващите поколения в застрашените микрогрупи. Активно съдействие му оказват ромските здравни медиатори и някои неправителствени лекарски и ромски организации.