

Т а б л и ц а 42

Относителен дял на ромските деца от седемте изследвани през 2008 г. страни, приемали лекарства в двуседмичния период преди изследването (по предписане и без лекарско предписание) в зависимост от типа лекарства (%)

Лекарствена група	България	Гърция	Испания	Португалия	Румъния	Словакия	Чехия	Общо
Лекарства за настинка, грип, възпалено гърло, бронхиален дискомфорт (без антибиотици)	33,5	22,9	35,1	56,4	37,0	32,1	40,2	35,3
Болкоуспокояващи или лекарства за понижаване на температурата	29,7	28,4	32,0	63,8	33,2	39,2	35,1	33,6
Ободряващи – витамини и минерали	21,4	1,5	4,2	5,2	17,9	22,6	14,4	14,9
Разслабителни	2,3	3,5	1,2	2,1	0,2	2,1	1,2	1,1
Антибиотици	15,8	10,9	10,1	11,1	15,2	20,2	14,7	14,6
Успокоителни, приспивателни	3,0	0,5	1,8	3,0	5,8	5,1	7,9	4,5
Лекарства против алергии	3,8	4,5	6,8	5,7	4,1	4,6	9,9	5,1
Лекарства против диария	3,8	3,3	2,2	7,2	4,9	3,5	3,6	3,9
Лекарства против повръщане	10,5	2,3	2,9	5,0	2,8	3,7	2,9	3,8

Източник: EDIS S. A. European Survey on Health and the Roma Community.