

Относителен дял на възрастните роми от седемте изследвани през 2008 г. страни, приемали лекарства в двуседмичния период преди изследването (по предписание и без лекарско предписание) в зависимост от типа лекарства (%)

Лекарствена група	България	Гърция	Испания	Португалия	Румъния	Словакия	Чехия	Общо
Болкоуспокояващи или лекарства за понижаване на температурата	29,2	37,6	35,6	58,9	31,2	42,1	41,5	35,0
Лекарства за настинка, грип, възпалено гърло, бронхиален дискомфорт (без антибиотици)	27,7	20,4	25,8	55,0	39,9	22,2	32,7	30,6
Лекарства за високо кръвно налягане	25,2	11,0	10,9	7,8	21,9	15,0	14,1	17,1
Противозачатъчни (само жени)	8,8	3,1	8,2	19,2	26,9	3,5	16,5	15,2
Антибиотици	12,2	8,7	10,5	2,1	19,3	11,0	11,2	13,3
Успокоителни, приспивателни	13,0	14,5	13,5	6,1	8,6	10,0	16,6	11,8
Ободряващи – витамини и минерали	14,4	5,8	5,3	2,8	14,7	13,4	13,0	11,1
Лекарства за сърце	13,5	8,5	3,6	4,8	17,7	8,7	7,6	10,5