

Т а б л и ц а 45

Относителен дял на възрастните роми от седемте изследвани през 2008 г. страни, приемили лекарства в двуседмичния период преди изследването без лекарско предписание в зависимост от типа лекарства (%)

Лекарствена група	България	Гърция	Испания	Португалия	Румъния	Словакия	Чехия	Общо
Лекарства за високо кръвно налягане	25,4	11,0	11,1	7,4	22,9	14,9	13,6	17,3
Болкоуспокояващи или лекарства за понижаване на температурата	17,5	14,9	21,3	11,6	13,7	10,3	14,5	16,3
Лекарства за настинка, грип, възпалено гърло, бронхиален дискомфорт (без антибиотици)	16,2	10,7	14,0	13,2	22,3	9,6	14,6	16,0
Противозачатъчни (само жени)	6,4	1,0	7,2	19,2	24,3	3,5	16,0	13,5
Антибиотици	10,2	7,5	9,6	2,1	15,8	10,1	10,8	11,4
Лекарства за сърце	13,3	8,5	3,6	4,8	18,7	7,7	7,2	10,4
Успокоителни, приспивателни	9,9	12,9	10,6	5,7	8,7	5,7	11,9	9,5
Лекарства против ревматизъм	9,7	3,0	4,6	5,7	15,7	3,7	5,6	8,4
Лекарства за намаляване на холестерола	4,9	7,4	5,8	9,5	10,9	4,7	7,0	7,2
Лекарства против диабет	7,5	5,1	3,8	5,6	9,0	5,2	7,1	6,4