

лата година са ми задавали въпроси, когато имунизирахме против хепатит, и те ме питаха дали не е опасно да останат без деца... Изглежда, техните имами им насаждат такива мисли...”

Възможно е причината за такива страхове да е породена от достигнала до ромите информация за стерилизация на ромски жени в Чехия и Словакия и от съществуващото недоверие към българите изобщо и към представителите на всякакъв вид институции.

Типът квартал също се оказва значим фактор за стриктното следване на имунизационната програма. Децата от изолираните квартали не са обхванати напълно от всички имунизации два-два и половина пъти по-често от децата в интегрираните квартали. Малките деца по-често имат пропуски в имунизационния календар в сравнение с по-големите.

В таблица 61 са представени някои от причините, посочени от родителите, поради които децата не са ваксинирани за всички задължителни случаи.

Т а б л и ц а 61

Относителен дял на ромските деца, които не са спазили програмата за ваксинации в зависимост от причините в България през 2008 г. (%)

Причини	Пол		Възрастова група		Общо
	мъже	жени	0–9 г.	10–15 г.	
Не е полезно и може да е опасно	10,0	8,1	6,7	12,5	9,1
Недостатъчна информация	35,0	43,2	40,0	37,5	39,0
Забравих	25,0	16,2	22,2	18,8	20,8
Затруднен достъп до ваксинационния център	7,5	8,1	4,4	12,5	7,8
Недостиг на финансови средства	7,5	8,1	8,9	6,3	7,8
Други причини	15,0	16,2	17,8	12,5	15,6
Всичко	100	100	100	100	100
База (брой)	(40)	(37)	(45)	(32)	(77)

Източник: EDIS S. A. European Survey on Health and the Roma Community.