

**Таблица 64**

Разпределение на хоспитализираните деца на възраст 0–17 г. в стационарите на лечебните заведения за периода 2005–2007 г. в България (%)

Болести	2007 г.	2006 г.	2005 г.
<b>Болести на дихателната система</b>	41,2	42,0	45,5
<b>Някои инфекциозни и паразитни болести</b>	13,3	12,5	10,1
<b>Травми, отравяния и други последици от външни причини</b>	8,0	–	7,4
<b>Някои състояния, възникващи през перинаталния период</b>	7,0	6,4	6,6
<b>Болести на храносмилателната система</b>	6,9	6,8	6,6
<b>Болести на пикочно-половата система</b>	4,4	4,3	4,1
<b>Бременност, раждане и послеродов период</b>	4,1	3,9	3,6
<b>Вродени аномалии, деформации и хромозомни аберации</b>	1,8	1,8	2,1
<b>Болести на нервната система</b>	1,8	1,9	1,6
<b>Кожни болести</b>	1,6	1,7	2,4
<b>Болести на органите на кръвообращението</b>	1,4	1,8	0,7
<b>Новообразования</b>	1,4	1,6	1,8

Източник: НЦЗИ, 2008.

### ***Продължителност на болничния престой в България***

По данни на Националния център за здравна информация средният престой на един болен в лечебните заведения за болнична помощ е намалял от 11,5 дни през 2000 г. на 7,2 дни през 2006 г. Това бе един от планираните резултати на реформата в болничната сфера. Когато сравним данните на НЦЗИ за средния болничен престой в страната с тези от изследването „Здравето и ромската общност: анализ на ситуацията в Европа...“, установяваме, че ромите престояват в болница по-дълго време от останалото население. Ако допуснем, че средният престой в болница през 2008 г. е останал на нивото на 2006 г. (последната, за която разполагаме с данни на НЦЗИ), средният престой на ромите в болница е с 2,6 дни по-продължителен, отколкото на цялото българско население.