

са и средните доходи, получавани от заетите роми. Това предопределя задържането на високи стойности на бедността дори в семейства, в които мъжът работи. През последните 20 г. рязко се влошиха жилищните условия на голям дял роми, живеещи в градските гета или дори в обособени махали в селата. Делът на българските роми с проблемно здраве, живеещи в изолирани и нехигиенични махали и в махали без здравни и социални услуги, е с 20–22% по-висок от средния, измерен в седемте страни. По-висок от средния е и делът на българските роми, живеещи в опасни за здравето жилища. Все още много бавно се променят патриархалните нагласи и традиционното разпределение на ролите и задълженията в българските ромски семейства. Мъжете в тях се включват в грижите по отглеждане на децата и в грижите за семейството в по-малка степен, отколкото са средните стойности за общността, и доста по-малко, отколкото в словашките, чешките и дори румънските ромски семейства.

При разглеждане на здравните индикатори се наблюдава, че българските роми демонстрират много лош здравен статус, дори когато ги сравняваме с ромското население от другите страни. Те имат най-ниска самооценка за здравето си в сравнение с ромите от всички останали страни, взели участие в изследването. Те най-често декларират, че поради лошото си здраве не могат да се справят с всекидневните си активности, но в същото време не получават нужната им помощ. Срещат изключително големи пречки да си извадят сертификат от ТЕЛК за инвалидност, дори когато са прекарвали инфаркт или инсулт, операция от рак, имат ХОББ или друго тежко инвалидизиращо заболяване. Българските роми са на първо място сред ромите от останалите страни, участвали в изследването, по редица заболявания като високо кръвно налягане, диабет, сърдечни болести, артрит и ревматизъм, болести на простатата и проблеми, свързани с менопаузата. На второ място са по заболявания от астма, хроничен бронхит и язва на стомаха. Обезпокояващо е, че част от тези заболявания са сериозно застъпени и при децата. Така България е на първо място по заболявания на ромските деца до 15 г. от високо кръвно налягане, а на второ – от астма и хроничен бронхит. Българските роми са декларирали едни от най-високите стойности на заболяване в две-