

лото население отминават по-леко, стават хронични за голяма част от жителите на ромските махали.

По данни на изследването „Здравето и ромската общност: анализ на ситуацията в Европа“ през последните две седмици преди провеждане на интервюта 28% от респондентите са страдали от някакво неразположение, настинка, вирусно или друг вид заболяване, което е довело до невъзможност да изпълняват всекидневните си дейности. Това е много висока стойност, която отново доказва по-голямата заболяемост сред ромската общност. Най-високите концентрации на този тип заболявания са при най-малките деца (при 38,2% от децата на възраст 0–9 г.) и при най-възрастните – лицата над 45 г. – 39,6%. Най-висок е дялът на лицата, страдащи от някакъв болестен симптом през последните две седмици, които живеят в паянтови къщи – 36%, и в жилища от подръчни материали – 32,4%. Най-честите болестни симптоми, от които са страдали децата, са свързани с банални простудни и вирусни заболявания, най-вече с възпаления на горните дихателни пътища. При възрастните болестните симптоми са повече и са индикации за повече заболявания: сърдечностъдови, на опорната, отделителната и нервната система, вирусни заболявания и др.

Това изследване показва, че 12,6% от цялото ромско население в страната, включително децата, е инвалидизирано или страда от тежко хронично заболяване. Специфична особеност при ромите са много ранното настъпване на инвалидизация и масовото хронифициране на заболяванията още в средна възраст. Една трета от мъжете и две пети от жените на възраст 45–60 г. вече са загубили част или изцяло работоспособността си поради лошо здравословно състояние. Дялът на лицата с диагностицирани хронични заболявания или инвалидност при най-възрастните (лицата над 65 г.) нараства на 70% – три пети при мъжете и три четвърти при жените.

Изследването демонстрира неравното разпределение на диагностицирането на инвалидността и хроничните заболявания в зависимост от големината на населеното място, интегрираността на квартала, типа жилище и наличието или отсъствието на здравна осигуровка. Някои от тези индикатори прикриват други значими фактори