


Презъ пролѣтѣта болестѣта се шири отъ цвѣтоветѣ по цвѣтната дръжка въ лѣтораслитѣ, които презъ влажно време сжщо образуватъ спори, както и по изгнилитѣ плодове. И когато пло-



а) Разрѣзъ на гнилобено гнѣздо (увеличено 15—20 пжти); б) синджирче отъ спори (увеличено 300 пжти); в) спори откъснати отъ синджирчето (увеличени 450 пжти); д) спори, които пушатъ израстъци (увеличени 300 пжти)

доветѣ порастатъ, споритѣ нападатъ по тѣхъ и по такъвъ начинъ гниенето се развива. По окапалитѣ на земята плодове се образуватъ спори, които могатъ да презимуватъ и на следната пролѣтѣ проникватъ въ цвѣтоветѣ на споменатитѣ по-горе овощни дървета.

*
* *

Срѣдства за борба срещу гнилобата:

1. Да се премахне всичко, което би могло да наранява младитѣ лѣторасли и плоדותѣ.

2. Да се събиратъ и унищожаватъ всички изсъхнали цвѣтове и лѣторасли. Това може да стане презъ пролѣтѣта, когато дървото се раззелени, та измрѣлитѣ части ясно личатъ.

3. Да се събиратъ и унищожаватъ всички загнили плодове, — били тѣ нападали по земята или останали да висятъ на дървото.

Всички тия мѣрки обаче трѣбва да се прилагатъ не единично отъ отдѣлнитѣ стопани, но по възможностъ общо отъ всички сѣседни градинари, защото при тъй голѣмата заразителностъ на болестѣта, избухне ли нѣкъде, и най-грижливиятъ стопанинъ може да пострада отъ нехайството на сѣседа си.