

На всички фактори у насъ: държавни, технически и културни се налага дългъ и внимание към преобразуване поминъка на планинското население. То отделя от твърде коравия си заљък за да плаща данъци, то носи безропотно кръвния данъкъ, носи всички държавно-обществени тежести и има право да иска от тия фактори по-голъмо внимание къмъ него.

Ще продължимъ.

Д-ръ Борисъ Ивановъ

Болести по лозята

1 — Переноспора (балсара, лъжлива мана)

Всъки лозарь си изпаша отъ нея. Всъки лозарь плаща данъкъ на тоя нежеланъ врагъ по лозята — кога повече, кога по-малко, нѣкѫде повече, нѣкѫде по-малко,

Що е переноспората? Какъ тя заразява лозята? Какъ можемъ да ги предпазимъ отъ нея?

— Переноспората напада всички зелени части на лозата: листа, млади лѣторасли, дръжки на цвѣтостовѣ и самите зърна.

Първите белези на болестта се появяватъ по листата. Къмъ срѣдата на май по горната имъ страна се появяватъ жълтиникови петна. Следъ дъждъ по долната имъ страна се образува бѣлъ повлакъ, приличенъ на мухъль. Петната ставатъ все по-жълти, докато изсъхватъ. Листътъ се сбръчква и сѫщо изсъхва.

По младите зелени лѣторасли гѣбата образува вглжбнати сиви или кафяви петна. Сѫщо такива петна се образуватъ и по цвѣтните дръжки, отъ които цѣлиятъ гроздъ умира.

По цвѣтостовѣ переноспората се срѣща рѣдко.

Гѣбата напада и гроздето. Когато зърната сѫ млади, обвиватъ се съ бѣли повлѣкли, засъхватъ, нагръчватъ се и при най-малкото раздрусване капятъ на земята. Това е **сивото гниене**. Ако зърната сѫ нападнати, кога сѫ по-наедрѣли, ставатъ кафяви и изсъхватъ. Сега имаме **кафяво гниене**.

Переноспората е гѣба, която не се вижда съ просто око. Нейните зародиши-спори се намиратъ въ въздуха и се носятъ заедно съ праха. Тѣ иматъ яйцевидна форма.

Ако зародишите на переноспората попаднатъ въ капка вода, то тѣ прорастватъ, т. е. отъ всъки зародишъ поникватъ 8 малки тѣлца, които иматъ по две реснични, съ които тѣ плуватъ въ водата.