

3. **Кучето е убито.** То трѣбва да се аутопсира, макаръ аутопсията да не може да ни даде сигурни, а само вѣроятни признаци за бѣса, тъй като видимитѣ и дори невидими (микроскопни) повреди нѣматъ нищо присъщо за бѣсови. Само опитното заразяване мозѣка на друго животно съ мозѣчно вещество отъ бѣсното куче, може да даде сигурна диагноза. Ала появата на заразяването тукъ е отъ 15 дни до 4—6 месеца. Презъ това време бѣсътъ ще се прояви у ухапаниа, преди това да стане у заразеното животно. Не трѣбва, значи, да се чака този резултатъ, за да се почне лѣкуването. У човѣка периодътъ за проявата на бѣса — ще рече отъ ухапването до появата на първитѣ признаци — трае отъ 20 до 60 дни.

Полезно ли е лѣчебното изгаряне на ухапаната рана? Изгарянето помага само, когато се извърши веднага, непосредствено следъ ухапването, защото проникването на бѣсовата зараза е извънредно бързо. Има умрѣли отъ бѣсъ хора, чиито ухапани рани сж били енергично изгоряни 30 до 40 минути следъ случката. На всѣки случай, изгарянето не дава сигурностъ.

Необходимо е Пастѣорово лѣчение. Това лѣчение трѣбва непременно да се извърши и — което е важно — колкото се може по-рано, особно ако ухапването е по главата. Почти винаги, заболѣлитѣ отъ бѣсъ презъ време на лѣкуването сж били ухапани по главата.

Най-сигурна сполука при лѣкуването е презъ първитѣ 8 дни. Опасно е да се отлага лѣчението три седмици следъ ухапването.

Лѣкуването у насъ се извършва въ **Централния бактериологиченъ институтъ** (Институтъ за народно здраве) въ София, за което има особни нареждания до общинскитѣ и други власти. Сжщо и въ бактериологичнитѣ и противобѣсни станции въ Варна и В.-Търново и при диспансера „Д. П. Кудоглу“ въ Пловдивъ.

При всѣко ухапване отъ животно, каквото и да било то, трѣбва да се прибѣгва до най-близкия лѣкаръ, за да се взематъ първи мѣрки противъ заразяването на раната и се направи по-трѣбното за по-нататъшното лѣкуване на пострадалия.