

Засѣтата еспарзета, въ зависимостъ отъ почвитѣ, трае 5—20 години; въ варовититѣ — най-дълго, а въ тежкитѣ черноземни — най-кратко.

Подготовката на почвата трѣбва да започне още презъ есенята, съ една дълбока оранъ. Презъ пролѣтѣта, желателно е, да се избѣгне пролѣтната оранъ, а подготовката за сѣитбата да стане съ култиватора и браната.

Сѣитбата трѣбва да се извърши рано на пролѣтъ, особено ако за посѣвъ се употребява нелющено семе, защото е необходимо достатъчно влага и време за поникването му. За ускоряване поникването, препоръчва се предварително накисване на семето въ вода, въ която да престои едно денонощие, следъ което да се пресуши, за да не залепне едно за друго. Напоследъкъ употребяватъ само олющено семе. На декаръ се хвърля 12—20 кгр. семе, въ зависимостъ отъ качеството на семето, силата и работката на почвата. Желателно е, преди засѣването да се изпита кълняемостта на семето, защото, обикновено, продаваното въ търговията семе нѣма по-голѣма кълняемостъ отъ 60—70 %. Това се дължи на обстоятелството, че еспарзетовото семе не зрѣе равномерно. Тъмното и много свѣтло, сивото и сбабушено семе трѣбва да се избѣгва, защото първото е старо, а второто недозрѣло. Засѣването може да стане съ редосѣялка или ржчно; въ първия случай се употребява 20 % по-малко семе. За по-правилното засѣване на семето при ржчната сѣитба, особено когато е намокрено и непросушено добре, вследствие на което се лепи едно о друго, препоръчва се размѣсването му съ суха, пресѣта прѣстъ. Заравя се на дълбочина колкото при пшеницата. Следъ ржчната сѣитба се завлича съ търновлакъ или дѣска. Валирането е препоръчително, както при ржчната така и редовата сѣитба.

Поникването започва следъ десетия день, а нѣкога и следъ втората седмица.

Отгледването презъ време на растежа е сжщото, както при люцерната; може да се сѣе, както нея, подъ покровно растение — овесъ или ечмикъ.

Еспарзетата дава, обикновено, една коситба и отава. Коси се, когато се е напълно разцѣфнала, което бива у насъ къмъ края на май. Суши се много по-лесно отъ люцерната, защото съдържа по-малко вода. При все това, трѣбва да се внимава, да не се ронятъ листата.

Дава 200—400 кгр. сухо сѣно и отава, която се използва за паша. Първата година, догдето се вкорени добре, не трѣбва