

Провѣтряването (вентилирането) и отводняването на рудниците става много добре; то има извънредно голѣмо значение за здравето на работниците въ тѣхъ.

Изнесенитѣ отъ галериитѣ вжглища се откарватъ въ така нареченитѣ **сепарации**, дето чрезъ особени машини съ решетки се разпредѣлятъ по голѣмина на парчетата на I, II, и III качество, а **паяката** (черни глинени парчета) се отдѣлятъ съ ржка отъ специални поставени работници.

Мината Перникъ притежава още голѣмъ и скъпъ инвентаръ на разни уреди и машини, има желѣзарски и дърводѣлски работилници, голѣма електрическа централа, модерна механическа фурна, болница, пожарна и спасителна команда и сума солидни постройки за канцеларии, продоволственъ магазинъ, амбулатория, читалище, театъръ, училище за децата на работниците, баня, работнически жилища съ повече отъ 200 отдѣлни апартамента и др.

Благодарение на това модерно устройство, мината Перникъ увеличава ежегодно производството на вжглища, и презъ 1928 г. сж били изкопани и изнесени на повърхността 1,188,569 тона, а презъ тая година то, вѣроятно, е достигнало близо до 1,250,000 т.

Мината ще се снабди скоро и съ фабрика за приготвяне на **брикети**, т. е. на тухли отъ ситни отпадъци отъ вжглищата, слепени съ асфалтъ или съ нѣкое друго горливо вещество и подложени на силно пресуване; такива тухли сж за предпочитане предъ обикновенитѣ на парчета вжглища, защото могатъ да се складиратъ по много на едно мѣсто, лесно се пренасятъ и горятъ отлично.

Д-ръ В. Ив. Неновъ

Какъ се предава бѣсътъ

Вънъ отъ известното на всички предаване на болестъта бѣсъ направо у човѣка отъ бѣсни животни чрезъ ухапване, срѣщатъ се редица други случаи, за които и не се помисля, че могатъ да станатъ причина за заразяване съ бѣсъ. Тия случаи, наблюдавани и проучени отъ лѣкари, сж поучителни и заслужава да се знаятъ отъ всички. Ще приведемъ нѣкои отъ тѣхъ.

Не само при бѣса, но и при всички други заразни болести, предаването на заразата не става изключително направо отъ болния на здравия, но и косвено, непрѣко, чрезъ вещи, предмети и други посрѣдници. Това косвено предаване се срѣща най-често при болести, чиято зараза е устойчива на външнитѣ влияния, въ