


на и ивици. Коремната му пъкъ страна е бледо-жълто-зелена.

Удълженитѣ челюсти на гавилала сж снабдени съ много, остри като шипове, зжби. Така удължена муцуната на гавиала показва, че той се храни предимно съ риба, която, благодарение на устата си и зжбитѣ, хваща много ловко,



■ [Фиг. 1. Гавиалъ — Индийски-крокодилъ, въ ямата предъ него има нѣколко яйца.

Гавиалътъ се размножава, като женската снася, въ издълбани отъ самата нея ями, 30—40 яйца. Андерсонъ разказва, че единъ пжтъ изрилъ изъ пѣсъка 40 яйца отъ гавиалъ, запазилъ ги и отъ тѣхъ се излюпили малки крокодилчета. Всѣко отъ тѣхъ било дълго 40 см., като 22 см. била дълга само опашката и 4 см. муцунката.

Алигатори и Каймани

Съ тѣзи имена сж познати крокодилитѣ въ Америка. Алигаторитѣ и Кайманитѣ сж близко сродни, иматъ тжпа муцуна, прилична на патешка човка или на устата на рибата щука.

Алигаторътъ се срѣща особено много въ водитѣ на рѣката Мисисипи и нейнитѣ притоци, затова носи името „*Мисисипийски алигаторъ*“. (глед. кар. № 2)

—Алигаторътъ е крокодилъ дългъ 4—5 м, като